



OFFICE OF PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION
351 North Mountain View Avenue, Third Floor ♦ San Bernardino, CA 92415-0010
(909) 387-9146 ♦ Fax (909) 387-6228

ALLAN RAWLAND, MSW, ACSW
Acting Public Health Director

TRUDY RAYMUNDO
Assistant Director of Public Health

MAXWELL OHIKHUARE, M.D.
Health Officer

Comunicado de inmediata
10 De septiembre de 2010
NR #10-82

Contacto: Maxwell Ohikhuare, M.D.
Oficial de salud pública
(909) 387-6218

Segunda muerte infantil de tos ferina en el Condado de San Bernardino

San Bernardino. En el condado de San Bernardino murió un bebé menos de dos meses de edad de tos ferina. Esta es la segunda muerte infantil del Condado de tos ferina en 2010.

“Este caso triste nos recuerda que la mejor manera de prevenir la tos ferina es en obtener la vacuna,” dice el Dr. Maxwell Ohikhuare, oficial de salud del Condado de San Bernardino. El declara énfasis en que la vacuna de refuerzo de tos ferina adolescente-adulto (Tdap), se recomienda para las siguientes personas:

- Todos de la edad de 7 años y mayores que no es plenamente inmunizado, incluyendo a aquellos que son más de 64 años de edad,
- Las mujeres de edad fértil, antes, durante o inmediatamente después del embarazo,
- Otras personas que tienen contacto cercano con las mujeres embarazadas o infantes.

“Inmunidad de la vacuna contra la tos ferina o enfermedad se disminuye con el tiempo, por lo que la mayoría de los adultos son susceptible a la tos ferina y deben recibir la vacuna para protegerse y proteger a sus familias,” dijo Ohikhuare. Los bebés son especialmente vulnerables si no están inmunizados o incompletamente inmunizados. Los bebés menores de 12 meses pueden tener una enfermedad más grave de la tos ferina, y tienen más probabilidades de tener complicaciones y ser hospitalizados que las personas de otros grupos de edad.

La vacuna contra la tos ferina es segura para niños y adultos. Los bebés pueden obtener la primera vacunación de tos ferina a los 2 meses de edad, pero no están adecuadamente protegidos hasta que se complete la serie de tres inyecciones a los 6 meses de edad. Es preferible que las mujeres embarazadas sean vacunadas después de las primeras 12 semanas de gestación.

-more-

Los padres también pueden ayudar a proteger a los bebés muy jóvenes reduciendo el contacto con las personas que tienen los síntomas del resfriado o enfermedad de la tos. La tos ferina es una enfermedad bacteriana que se extiende a través del aire de persona a persona, a través de estrecho contacto con las gotitas que se liberan cuando alguien tose o estornuda. La enfermedad comienza con síntomas similares a un resfriado que son más severos después de una o dos semanas. Después siguen ataques de tos rápida, que pueden tener un sonido de falta de respiración, de una duración de 6 a 10 semanas.

Se urge que los adultos se pongan en contacto con su proveedor de atención médica para obtener información acerca de cuál vacuna de refuerzo es mejor para ellos y para que sean inmunizados. Las vacunas son un beneficio rutinario cubiertas por la mayoría de los planes de seguro de salud.

Dr. Ohikhuare recomienda que todos los proveedores de atención de salud sigan una mayor vigilancia para la tos ferina y traten con prontitud los síntomas de la enfermedad.

Los actuales niveles de epidemias de tos ferina en California son las más altas que se han reportado en 52 años. Hasta la fecha, ha habido **3,834** casos confirmados, probables y sospechosos de tos ferina en 2010. Esto es un aumento de siete veces del número de casos reportados durante el mismo período de tiempo en 2009, cuando se reportaron **530** casos.

En el Condado de San Bernardino, **40** casos de tos ferina han sido confirmados hasta la fecha. El año pasado para este tiempo, hubo **7** casos reportados en el condado.

El Departamento de Salud Pública del Condado de San Bernardino proporciona la vacuna contra la tos ferina en todas sus clínicas. Para ubicaciones y horarios de las clínicas llame al 1 (800) 782-4264, o visite el sitio Web en www.sbcounty.gov/dph.

Para más datos sobre orientación de la tos ferina y la vacuna, visite el departamento de salud pública del estado de California en <http://www.cdph.ca.gov/HealthInfo/discond/Pages/Pertussis.aspx>, o al sitio web del U.S. Centers for Disease Control and Prevention (Los Centros de Estados Unidos de Prevención y Control de Las Enfermedades) en el <http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/pertussis/default.htm>.

###